

Omzetprotocol Biosimilars

wijzigingen per 01-01-2021	VGZ – Zorg & Zekerheid – ENO - ASR	
	December 2020	Januari 2021
Insuline Aspart	Novorapid Flexpen Novorapid penfill	Insuline Aspart Solostar Insuline Aspart penfill (AllStar PRO pen)
Insuline Isofaan	Humuline Kwikpen Humuline penfill	Insulatard Flexpen Insulatard penfill (NovoPen 5)
Insuline Lispro	Humalog Kwikpen Humalog penfill Humalog flacon	Insuline Lispro Solostar Insuline Lispro penfill (AllStar PRO pen) Insuline Lispro flacon
wijzigingen per 01-01-2021	Zilveren Kruis	
	December 2020	Januari 2021
Insuline Glargine	Lantus / Abasaglar	Lantus Solostar
wijzigingen per 01-04-2021	Zilveren Kruis	
	Maart 2021	April 2021
Insuline Aspart	Novorapid Flexpen Novorapid penfill	Insuline Aspart Solostar Insuline Aspart penfill (AllStar PRO pen)

1. Biosimilar preferent?
 - Ja, ga door naar stap 2
 - Nee, huidige insuline kan gecontinueerd worden
2. Waar staat de patiënt onder behandeling?
 - MST / ZGT / Huisarts / POH
 - Ga door naar stap 3
 - Bij overige voorschrijvers
 - Neem contact op met desbetreffende voorschrijver
3. Patiëntkenmerken
 - Bij kinderen, patiënten met eens zwangerschapswens of zwangeren
 - Huidige insuline continueren
 - Bij alle overige patiënten
 - Ga door naar stap 4
4. Geef een duidelijke uitleg over de omzetting naar de biosimilar, verstuur juiste patiëntenbrief
 - Patiënt wil de preferente insuline niet proberen / gaat niet akkoord met de omzetting
 - Niet-preferente insuline komt voor eigen rekening, tenzij medische noodzaak conform richtlijn zorgverzekeraar.
 - Patiënt gaat akkoord met de omzetting
 - Ga door naar stap 5
5. Schrijf biosimilar aan met een WMG tarief eerste terhandstelling
 - Informeer de behandelende arts over de omzetting
 - Betreft het een penfill?
 - Breng ook een nieuwe pen in conform bovenstaande tabel
 - Spuit de patiënt halve eenheden, niet alle pennen ondersteunen dit. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de junior pen.

6. Geef de patiënt duidelijke voorlichting over de omzetting en geef – indien van toepassing – een duidelijke peninstructie in de spreekkamer
 - Let hierbij op de volgende aandachtspunten:
 - Het aantal eenheden blijft hetzelfde als voorheen
 - Zelfde streefwaardes aanhouden als afgesproken
 - 5 dagen na het starten met de biosimilar een 5-punts dagcurve te maken
 - Indien dagcurve afwijkt van wat patiënt gewend is, moet de patiënt contact opnemen met de (huis)arts, POH of diabetesverpleegkundige
 - Bij andere klachten, vervelende ervaringen, hypo's of hyper is het dringend advies contact op te nemen met de apotheek, (huis)arts, POH of diabetesverpleegkundige
 - Stel de patiënt in de gelegenheid om vragen te stellen
7. Maak een vervolgspraak na 2 weken om de omzetting te evalueren, geef indien nodig opnieuw een instructie.